

5%-ного креолина. Для обеззараживания предметов ухода зараженных *С.І. septicum*, использовали холодные растворы 1,5-1%-ного формальдегида, 3-4%-ной серно-карболовой смеси, 3%-однохлористого йода, осветленного раствора хлорной извести с содержанием 1%-ного активного хлора, а также горячие растворы (+70 - +75°C) 2-3%-ного креолина и едкого натра.

Результаты производственных опы-

тов доказывают, что разработанные нами в лабораторных условиях режимы дезинфекции полностью подтверждаются в производственных условиях. Эти режимы дезинфекции эффективны при обеззараживании поверхностей, инфицированного возбудителями бразильского овец при расходе 1 литра дезинфицирующего раствора на 1м<sup>2</sup> поверхности с однократным нанесением при экспозиции 2-3 часа.



## БАЈТАРЛЫГ ГУНДУЗЛАРЫНДАН АЈРЫЛМЫШ ПАСТЕРЕЛЛАЛАРЫН ПАТОКЕНЛИК ФАКТОРЛАРЫНЫН ӨЈРӘНИЛМӘСИ

Е. М. АҒАҖЕВА,

бајтарлыг елмләри намизәди

Азәрбајҗан Дөвләт Кәнд Тәсәррүфаты Академијасы

**М**икроб токсинләри вә аг-  
рессинләри хәстәлик тө-  
рәдичисинин патокенли-  
јини көстәрән әсас факторлар һеса-  
билир (1).

Бајтарлыг гундузларындан ајрыл-  
мыш пастереллаларда агрессин әмәлә  
кәтирмәни өјрәнмәк үчүн биз пасте-  
реллалары ПБ-да јетишдирдик вә  
онун булјон културасыны инкишафы-  
нын лагорифик фаза дөврүндә исти-  
фадә етдик, сонра филтрат алыб ону  
јохладыг.

Мүәјјән олунду ки, агрессин әмәлә  
кәтирмә хассәси штаммын патокенлик  
дәрәчәсиндән биләваситә асылдыр.  
Штаммын диссозијасындан асылы ола-  
раг онун агрессин јаратма габиліјјәти  
дә ашағы дүшүр. Диссозијасија олун-  
муш гранулјар вариантлар агрессин  
әмәлә кәтирмә габиліјјәтини итирир.

Биз Н<sub>1</sub> вә НК<sub>18</sub> (диссозиант) пасте-  
релла штамларынын 1-12 күнлүк кул-  
тураларынын филтратларында агресси-  
нин консентрасијасыны өјрәндик. Бу  
мәгсәдлә биз Н<sub>1</sub> вә НК<sub>18</sub> штамлары-  
нын културалары илә ада довшанлары-  
ны дәриичи јолухдурдуг вә һәр күн  
көвдәнин бојанмыш һиссәсини илкин  
вәзијјәтә әсасән өлчүб нәтичә чыхарт-  
дыг.

Мүәјјән олунду ки, көһнәлмиш кул-  
тураларда агрессин әмәлә кәтирмә зә-  
ифләјир. Һәмчинин пастереллаларда  
агрессин әмәлә кәтирмә онун патокен-  
лији илә дүз мütәнасибдир. Бундан  
әлавә диссозиасија олунмушларда а-  
грессин әмәлә кәтирмә хүсусијјәти јох-  
дур (1-чи чөдвәл).

Мүәјјән етдик ки, култура филтра-  
тыны 30 дәгигә әрзиндә 60°C темпера-  
турда сахладыгда агрессин тамамилә  
инактивләшир. Биз пастерелла култу-  
раларынын патокенлијини јохламаг  
үчүн тәркибиндә агрессин олан факт-  
ларла лабораторија тәчрүбә һејванла-  
рыны јолухдурдуг. Ағ сичанларын са-  
бит бактерија дозасы илә вә бу дозада  
агрессинин мүхтәлиф мигдарлары илә  
јолухдурмада мәлум олду ки, агресси-  
нин ролу инфексијанын баш вермәси  
вә инкишафында мүһүмдүр.

Ағ сичанларын јолухдурулмасы үзрә  
апарылан тәчрүбәләр көстәрди ки, 10<sup>-3</sup>  
дурултма дәрәчәсиндә 0,3 мл дозада  
бактерија културасы агрессинин ишти-  
ракы илә јолухдурулмуш һејванларда  
15-18 саата 100% өлүм верирсә, јолух-  
дуручу материалда агрессин олмадыгда  
јалныз 48 саатдан сонра өлүм гејд еди-  
лир.

Јолухдуручу материалда агрессин вә  
токсинин олмамасы заманы пастерел-  
лаларын јухарыда гејд едилән дозасын-  
дан үчүнчү груп ағ сичанларда өлүм  
66% олмагла, һәм дә хәстәлијин кеди-  
шинә узун мүддәтлији нәзәрә чарпыр.

Ағ сичанларын 10<sup>-6</sup> вә 10<sup>-7</sup> дурултма  
дәрәчәсиндә олан тәбии пастерелла  
културасы илә јолухдурулмасында өлүм  
баш вердији һалда, һәмин дозада анчаг  
агрессинсиз вә токсинсиз бактерија  
културасындан өлүм мүшаһидә едилмә-  
ди.

Лабораторија тәчрүбә һејванлары  
үзәриндә тәчрүбәләр нәтичәсиндә мү-  
әјјән олунду ки, ади агрессин вә терми-

ки тә'сирлә инактивләшдирилмиш пастерелла агрессивини антикенлик хусу- сийјәтинә маликдир.

Термики тә'сирлә инактивләшди- рилмиш агрессивин антикен кими ади аг- рессиндән фәалдыр. Пастерелланын булјон културасына 0,5% мигдарында формалин әлавә етдикдә һәм ади вә һәм дә инактивләшдирилмиш һалда олан агрессивинин антикенлик хусу- сийјә- тини нејтраллашдырыр (2-чи чәдвәл).

Пастерелла агрессивини илә иммуни- засија олунмуш һејванларда инфексија- ја гејри-һәссаслыг јараныр. Бу заман иммунитетин кәркинлији онлара јери- дилән агрессивинин антикен активлијин- дән асылыдыр. Пастерелла агрессивини- нә формалинлә тә'сир етдикдә онун иммунокенлијини зәифләдир.

Пастерелла агрессивинләринин пато- кенлик вә иммунокенлик факторла- рында ролуна даир әлдә етдијимиз кәс- тәричиләр әсасында белә бир нәтичәјә кәлмәк олар ки, пастереллјоз әлејһинә ваксинләрин тәркибинә формалин га- тылмамалыдыр, чүнки о организмдә аг- рессин әлејһинә иммунитетин форма-

лашмасына мане олур вә она кәрә дә белә ваксинләрин иммунокенлјини кәскин шәкилдә ашағы салыр.

Пастереллаларын екзотоксин һасил етмә хассәси һаггында ваһид фикир јохдур. Белә ки, Ј. Е. Колјакон (1986) тәсдиг едир ки, пастериаллар екзоток- син јаратмыр, бактерија һүчәјрәсинин парчаланмасы нәтичәсиндә ендотоксин һасил едир ки, буну да Y. С. Debnatr, T. S. Sharm (1983), Schimmed (1982) тәсдиг едирләр.

Батаглыг гундузларындан ајрылмыш пастереллаларда токсин әмәлә кәтир- мә хусу- сийјәтини биз токсин әмәлә кә- тирмәни күчләндирән тәркибиндә бө- јүк фаиздә зүлал олан Мартен булјо- нунда, һәмчинин тәркибиндә 0,5% глү- коза олан Хоттинкер булјонунда өјрән- дик.

Гејд олунан гида мұһитләриндә ток- синин топланмасыны мұәјјән етмәк үчүн пастерелла култураларыны 37°С температурда термостатда 48-72-98 са- ат јетишдирдик, дөврләринин сајы дә- гигәдә 6 мин олан режимдә 60 дәгигә центрифугадан кечиртдик.

1-чи чәдвәл

Пастереллаларын булјон култураларынын филтратында јетишдирилмә мүддәтиндән асылы олараг агрессивинин мигдарынын дәјишилмәси (Аристовскијә кәрә дәринчи сынаг)

Културанын јетишдирилмә мүддәти күнлә	Инјексија јериндә бојанмыш саһә мм²-лә		Илкин вәзијјәтә нисбәтән бојанмыш саһәнин бөјүмәси
	Инјексијадан сонра	24 саат кечмиш	%-лә
1	35	125	370
6	40	140	340
9	45	125	282
10	30	110	269
12	35	100	260
14	35	100	259
15	35	90	250
Стерил □ПБ	36	63	175

2-чи чәдвәл

Пастерелла агрессивинләринин онун активлијиндән асылы олараг иммунокенлик хусу- сийјәтләри

Тәчрүбә груплары	Һејванларын мигдары	Дәриалты инјексија- да антикенин дозасы	Јеридилмиш материалда агрессивинин вәзијјәти	Иммунизасијасындан 14 күн кечмиш хәстәлик төрәдичисинин 10 мин летал дозасы илә јолухдурма заманы һејван- ларда горујучулуг сәвијјәси		
				сағ галды	өлдү	горујучулуг %-лә
I	20	0,5	Ади	7	13	35
II	20	0,5	Термики тә'сирлә инак- тивләшдирилмиш	11	9	55
III	20	0,5	Ади формалинләшдирилмиш	1	19	50
IV	20	0,5	Термики тә'сирлә инактивләш- дирилмиш, формалинләшдирилмиш	0	20	0
Нәзарәт	10	0,5 стерил ЭПБ	—	0	10	0

Чөкүнтү үзәриндәки маје һиссәјә хлороформ (20 мл културал мајејә 1 мл) әлавә етдик, гарышдырдыг вә 60 дәгигәдән сонра хлороформу ајырдыг.

Бактеријасыз шәффаф мәһлулу экзо- токсин кими истифадә етдик.

Әввәлчәдән ЭПБ вә Мартен булјо- нунда токсинин әмәлә кәлмәси вә саһлан-



масынын оптимал мүддәтини тә'јин етдик.

Бу мәгсәдлә пастереллаларын 12 штаммыны 2 ај әрзиндә јохладыг. Бу култураларын филтраты илә вахташыры олараг ағ сичанлар 0,5 мл дозада 1:2-дән 1:128 гәдәр дурултмада гарын бошлуғуна јолухдурулду.

Мүәјјән олунду ки, илк 2 күндә токсин әмәлә кәтирмә 7 штаммда мүшәһидә едилди, сонра 10-чу күн даһа 3 штаммда бу хассә нәзәрә чарпды, 2 штаммда исә (R-форма) токсин јаратма гејд олунмады. Ону да гејд етмәк лазымдыр ки, тәчрүбә ајынын сонунда токсинин зәифләмәсини вә бир чох штаммларда онун тә'сиринин тамамилә итмәси нәзәрә чарпды.

Беләликлә, батаглыг гундузларындан ајрылмыш пастереллаларда токсин әмәлә кәтирмә Мартен булјонунда бөјвермәнин 2-чи күнүндән башлајыр, 10-чу күнү максима чатыр вә 15-чу күндән тәдричән ашағы дүшүр вә 30-чу күндә әксәр штаммларда тамамилә онларын тә'сири итир.

Молекулјар күтләсинә көрә токсинин ејничинсли олмасыны өјрәнмәк мәгсәдилә пастереллаларын НЕР, Е<sub>1</sub>, Е<sub>2</sub>, Н<sub>22</sub> эпизотик штаммларындан әлдә едилмиш токсинләрин кел-филтрәсијасыны апардыг. Функцијалашдырманын нәтичәләри кәстәрди ки, екзотоксинләр үч пик үзрә чыхарылыр вә бунлар арасында ғыса фәсилә олур.

Алынмыш биринчи фраксија полиетиленгликолла гатылашдырылдыгдан сонра ағ сичанлар үчүн токсик олду.

Икинчи вә үчүнчү фраксијалар исә

ағ сичанлар үчүн токсик дејилди. Бу да ону тәсдиг едир ки, токсик хусусијәтә малик олан фраксијалар молекулјар чәһәтдән ејничинсли дејил.

Сонракы тәчрүбәләримиздә биз тәмизләнмиш екзотоксиндән, јә'ни онун биринчи јүксәк молекулјар фраксијасындан истифадә етдик.

Хәстәлијин мүхтәлиф кедишләриндә батаглыг гундузларындан ајрылмыш пастереллаларын 88 штаммынын токсикен хусусијәтини өјрәнән заман мүәјјән олунду ки, пастереллјозун ити кедиши заманы ајрылан вә В серотипинә мәнсуб олан пастереллаларын 40 штаммы токсикен хассәјә маликдир. Белә ки, 1:8, 1:12, 1:32-дә онларын булјон културасынын филтратларыны ағ сичанларын гарын бошлуғуна инјексија етдикдә, онлары 48 саата өлдүрүр.

Пастереллјозун хроники кедиши заманы ајрылмыш вә А, В вә әсасән дә Д серотипинә мәнсуб олан 21 штаммдан јалныз 2-си 1:8-ә нисбәтиндә токсикен олмасы илә өзүнү кәстәрди.

Пневмонијалар заманы ајрылмыш вә А, Д вә бә'зиләри В серотипинә мәнсуб олан пастереллаларын 27 штаммынын әксәријјәти токсикен хусусијәтинә малик дејил. Јалныз бунлардан 7 штамм зәиф токсин истәһсал етмәклә 1:8 нисбәтиндә дурултмада ағ сичанлары өлдүрдү.

Беләликлә, В, Д вә А серотипинә мәнсуб олан пастереллаларын 88 штаммындан 49-у (55%) токсикен хусусијәтә маликдир. Токсикен штаммлар әсасән пастереллјозун ити кедиши заманы ајрылмыш вә В типинә мәнсуб олмушлар.

#### ӘДӘБИЈАТ

1. Ганиев М. К. Аскеров А. А., Мирза-заде С. В., Дашдамиров Д. М. Пастереллез с/х животных. - Баку, элм, 1970
2. Коляков Я. Е. Ветеринарная иммунология. - М., 1986
3. Куликова И. Л., Попова Т. Е. II Ветеринария. - 1995.-N-7. - с. 25-27
4. Шапошникова Е. К. II Ветеринария. - 1989. N-9. - с.41-43
5. Debnath Y. C. Sharm T. S. Effect of *Pasteurella multocida* and endotoxine on serum in buffalo and rabbits II Yndian Vet. Y., 1983, N-10, p. 777-786.
6. Schimel D. T. C., A shock reaction and pneumonia after the introduce endotoxine of *Pasteruella multocida* II Arch. exp. Veterinarmed, 1982, N-6, p. 881-887.



## ЈОВШАНЫН ГОЈУНЛАРДА МӘ'ДӘ-БАҒЫРСАҒ СТРОНКИЛ-ЈАТЛАРЫНА ГАРШЫ АНТЬЕЛМИНТ СӘМӘРӘЛИЛИЈИ

С. Г. МӘҒӘРРӘМОВ,  
бајтарлыг емләри намизәди,

Ј. Мәммәдәлијев адына Нахчыван Дәвләт Университети

**Б**ејванларын хәстәликләринә, о чүмләдән һелминтоз-лара гаршы дәрман битки-ләринин истифадә едилмәси чох гәдимдән мә'лумдур. Бу истигамәтдә сон 20 илдә Азәрбајчан Елми Тәдгигат Бај-